

Les précautions STANDARD, l'hygiène des mains et le bionettoyage sont les garants de la prise en charge optimale de TOUS LES PATIENTS.

Rappel :
en période d'épidémie COVID tous les soignants portent un masque chirurgical pour les contacts patients et un masque FFP2 en cas de gestes aérosolisants

- Patient non immunodéprimé
- Patient hospitalisé en MCO
- (médecine, chirurgie, obstétrique)

- Patient immunodéprimé
- Patient avec une forme grave
- Patient hospitalisé en réanimation

DDS = Début des symptômes

sinon

DDP = Début de positivité (jour de la 1ère RT-PCR positive)

Précautions
« COVID »

Transfert possible en SSR ou en EPHAD à DDS +8 jours ou DDP +8 jours
Si depuis 48 heures :

- Fièvre $\leq 37^{\circ}8$
- $O_2 \leq 2l/mn$ pour maintien d'une $SaO_2 \leq 95\%$ au repos

DDS+ 14 jours

Ou DDP + 14 jours si patient asymptomatique

Levée des précautions

« COVID »

Précaution
« STANDARD »
+ mesures barrières

DDS = Début des symptômes

sinon

DDP = Début de positivité (jour de la 1ère RT-PCR positive)

Précautions
« COVID »

Transfert possible en SSR ou en EPHAD à DDS+10 jours ou DDP +10 jours
Si depuis 48 heures :

- Fièvre $\leq 37^{\circ}8$
- $O_2 \leq 2l/mn$ pour maintien d'une $SaO_2 \leq 95\%$ au repos

DDS+ 24 jours

Ou DDP+24 jours si patient asymptomatique

Levée des précautions

« COVID »

Précaution
« STANDARD »
+ mesures barrières

Pas de nécessité de 2ème PCR pour lever les précautions